

診療計画説明書 白内障手術（2泊3日）

	入院・手術日（月日）		術後1日目 （月日）	術後2日目（退院） （月日）
	手術前	手術後		
退院基準	患者あるいは家族が点眼できる。			
達成目標	手術について不安な点がなく、心身ともに安定した状態で手術を受けることができる。		点眼ができ退院後の生活の注意点を理解できる。	
検査	・ 外来にて診察があります。		・ 朝、外来（平日）または病棟（休日）にて診察があります。	
処置	<ul style="list-style-type: none"> 手術衣に着替えます。 ネームバンドを手術側の手首に装着します。 点滴の針を挿入します。 トイレは手術開始30分前に済ませてください。 	・ 点滴終了後に針を抜去します。	・ ネームバンドをはずします。	
薬剤	<ul style="list-style-type: none"> ベガモックスを昼食前/後に2回ずつ点眼してください。 手術2時間前より点眼を開始します。 <p>⇒①②を20分間隔で交互に点眼します。</p> <p>①ミドリンP ②ミドリンP ジクロード ネオシネジン</p> <p>2時間以降は、ミドリンPのみを20分毎に点眼します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 搬出時にベガモックスを点眼します。 <p>特別な指示がなければ</p> <ul style="list-style-type: none"> 糖尿病の薬は昼食分を中止して下さい。 夕食後からはいつもどおりに服用してください。 インスリンは半量あるいは半量弱皮下注してください。 その他の内服薬はいつもどおりに服用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 食後より抗生剤の内服（2日間）が開始になります。 	<ul style="list-style-type: none"> 点眼 クラビット } 朝、昼、夕、寝る前 ジクロード } リンデロン } ミドリンP 寝る前 <p>※ 手術後最初の点眼は診察後より開始です。</p> 	
食事	・ 昼食は軽く（半分程度）食べてください。	・ 通常通り食べてください。		
安静	・ 自由です。	・ できるだけ安静に過ごしてください。	・ 基本的には自由です。	
清潔		・ 顔は拭くだけにしてください。	<ul style="list-style-type: none"> 洗顔・洗髪・入浴は1週間禁止です。 首下シャワーは可能です。 	
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> 入院までの経過や症状などを伺います。 病院内の案内、日課、注意事項などのお話をします。 薬剤師から目薬および使用中の薬について説明があります。 手術室へは車椅子で移動します。 	<ul style="list-style-type: none"> ネオシネジン点眼薬は処分しますので看護師に渡してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 看護師が図表を使用し点眼方法を説明します。 保護帯は1週間ほど就寝中はつけてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 退院時に次回外来予約を確認します。 退院時に点眼薬の箱をお返しく下さい。

* 病名は現時点で考えられるものであり、今後検査を進めていくにしたがって変わり得ます。

* 入院期間は治療内容や現時点で予測されるもので、症状により変わります。