

終了基準		・発熱がない ・頭痛などの麻酔の影響がない ・濃い血尿がない ・自尿がある			
経過	入院日・手術前日	手術当日		術後1日目	術後2日目(退院)
日付	/	手術前	手術後	/	/
達成基準	<ul style="list-style-type: none"> 手術について理解できる 手術を受ける身体的準備ができています 	<ul style="list-style-type: none"> 頭痛や吐き気などの麻酔の影響がない 体温や血圧、呼吸状態など異常がみられない 濃い血尿がない 尿管に持続的に尿の流出がある 		<ul style="list-style-type: none"> 排尿困難感がない 	
検査処置	<ul style="list-style-type: none"> 入院前に外来で検査します。 身長、体重・心電図、レントゲンの検査があります。 必要時、除毛します。 	<ul style="list-style-type: none"> 時計、指輪、入れ歯をはずして、手術用に準備された寝衣に着替えてください。 名前を確認するためのバンドを右手に巻きます。 			<ul style="list-style-type: none"> 退院の際、名前を確認するためのバンドをはずします。
薬剤	<ul style="list-style-type: none"> 必要であれば、寝る前に下剤、眠剤を希望できます。 内服中の薬があれば、医師、看護師にお知らせください。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師より内服指示があれば、朝7時に内服していただきます。 点滴をするための針を腕に入れ、朝から点滴をします。 点滴をしながら手術室へいきます。 		<ul style="list-style-type: none"> 夕方の点滴が終了したい、点滴の針を抜きます。 	
食事	<ul style="list-style-type: none"> 常食または治療食がです。 	<ul style="list-style-type: none"> 午前手術は起床後より絶飲食です。 午後手術は朝食後より絶飲食です。 	<ul style="list-style-type: none"> 帰室後、許可が出れば4時間後より水分のみ開始となります。それまで絶飲食です。 のどが渴けば、うがいはできます。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝から常食または治療食がです。 	
安静度	<ul style="list-style-type: none"> 病院内であれば、自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 病棟内のみ自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 翌朝までベッド上安静のため、頭を上げたり、座ったり、歩行することはできません。 寝返りをうつことはできます。 	<ul style="list-style-type: none"> 病棟内を歩くことができます。 	<ul style="list-style-type: none"> 座ったり、立ったときに頭痛、肩こり、吐き気、めまいがあるときにはお知らせ下さい。
排泄			<ul style="list-style-type: none"> 尿管がはいっています。 排便がしたい場合は、お呼びください。手術後8時間が経過していれば、看護師介助にて排便時のみトイレ歩行(状態により車椅子使用)できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 歩いてトイレに行くことができます。 	<ul style="list-style-type: none"> 経過をみて尿管を抜きます。 
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 入浴、シャワーをしてください。爪をきってください。 			<ul style="list-style-type: none"> 午前中に体を拭きに伺います。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師の許可が出ればシャワー浴可となります。 
指導説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活の説明 手術についての説明 手術承諾書を提出してください。 手術に必要な物品を確認します。 化粧・マニキュアを落としてください。 ご不明の点は主治医、看護師にお尋ねください。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後の説明 尿道に管が入っているため、尿道の痛み、おしっこがしたい感じがします。また便がしたいようなら我慢せずにお知らせ下さい。 <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> おしっこがしなくなっても かまないでください！ </div>		<ul style="list-style-type: none"> 麻酔を使用しているため、頭痛や吐き気がすることがあります。痛み止め、吐き気止めを使用しますのでお知らせください。 	<ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活・外来受診について説明があります。

※病名等は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わります。

※入院期間や治療内容は現時点で予想できるものであり、症状により変わります。