






終了基準	・37.5以上の発熱がない ・排便が1回/1～2日はある ・退院後の日常生活の注意点がわかる		
経過	1日目	2日目～	13日目(退院日)
月/日	/	/ ~	/
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全・安楽に治療を受けることができる</li> <li>正しく内服できる</li> <li>点滴部位が痛い時や、嘔気など異常を知らせることができる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>副作用が最小限で治療が続けられる</li> <li>正しく内服できる</li> </ul>
処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>点滴チューブが入っていない場合は、主治医に挿入してもらいます</li> <li>主治医の指示に従い点滴を始めます(だいたい6時間程度かかります)</li> <li>点滴チューブは翌日予定が無ければ抜針します</li> <li>朝よりプレドニンの内服が開始となります</li> </ul>		
薬剤			
検査	朝 ( )錠 昼 ( )錠 夕 ( )錠 5日間続きます <ul style="list-style-type: none"> <li>主治医の指示にて、血糖測定がある場合があります</li> </ul>		
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常の食事です。治療にて食欲が落ちる場合は、アシスト食を用意しておりますので、担当看護師にお知らせください</li> <li>水分は多めにとってください(目安としては、1日600～1000ml)</li> </ul>		
安静度	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本的には自由ですが、トラブルを避けるためにも、治療中は、棟内でお過ごしください</li> </ul>		
排泄	<ul style="list-style-type: none"> <li>トイレはウォシュレットをご使用ください</li> <li>便秘や下痢になるようでしたら、お知らせください</li> </ul>		<b>&lt;日常生活の注意点&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>うがい・手洗いはそのまま続けて下さい</li> <li>人混みに行くのは、出来るだけ避けてください</li> <li>指示された内服薬は確実に服用しましょう</li> <li>熱が出たり・具合が悪い時、昼間は内科外来、夜間は救急外来を受診して下さい</li> </ul>
清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>うがい・手洗いはこまめに行いましょう</li> </ul>		
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療後熱が出たりすれば、抗生物質の投与もあります</li> <li>白血球が下がっている場合は増やす注射を使用することもあります</li> <li>医療費について相談があれば、お申し出下さい</li> <li>ご不明な点は主治医、看護師にお尋ねください</li> </ul>		

※ 病名は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得ます。

※ 入院期間や治療内容は現時点で予想できるもので症状により変わります。