


診療計画説明書 経皮的エタノール注入療法(PEIT)初回

退院基準	嘔気、腹痛がない			
経過	PEIT前日(入院日)	PEIT当日治療前	PEIT当日治療後	PEIT後1日目(退院日)
月日	/			
達成目標	治療について理解できる、身体的準備ができている		血腫がない、嘔気・腹痛がない	
処置	<ul style="list-style-type: none"> 身長体重を測定します 名前を確認するためのバンドを右手に巻きます 	<ul style="list-style-type: none"> 治療用に準備された検査着に着替えてください ストレッチャーで点滴をしながら治療室まで行きます 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後、看護師にて適宜検温測定に伺います(帰室時、帰室1時間、帰室2時間) 刺した部位をアイスノンで冷やします 安静解除後に刺した部位のガーゼを絆創膏に貼り替えます 	<ul style="list-style-type: none"> 刺した部位の絆創膏をはがします
注射薬 内服薬	<ul style="list-style-type: none"> 現在内服している薬、入院前から中止している薬がありましたら医師、看護師にお知らせください 	<ul style="list-style-type: none"> 医師より内服指示がある薬を朝内服していただきます 点滴をするための針を左腕に入れます 	<ul style="list-style-type: none"> 搬出時の点滴が終わったら針を抜きます 	
食事	<ul style="list-style-type: none"> 常食または、治療食となります 21時以降は絶食です(水分は可能です) 	<ul style="list-style-type: none"> 起床後7時から絶食です 	<ul style="list-style-type: none"> 飲水や食事はできませんが、うがいはできますので看護師にお伝えください 帰室後2時間後より主治医の許可にて食事開始となります。それまでは絶食です 	<ul style="list-style-type: none"> 常食または、治療食がでます
安静度	<ul style="list-style-type: none"> 病院内自由です 	<ul style="list-style-type: none"> 病棟内自由です 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後、ベッド上安静です。帰室後2時間経過し、問題なければ病院内自由となります 	<ul style="list-style-type: none"> 病院内自由です
排泄		<ul style="list-style-type: none"> 治療前に排尿をすませてください 	<ul style="list-style-type: none"> 排尿、排便がしたい場合はお知らせください。ベッド上安静の場合は尿瓶または差込便器を使用していただきます 	
清潔				<ul style="list-style-type: none"> 刺した部位の出血や発熱がなければシャワーを浴びることができます
説明 指導	<ul style="list-style-type: none"> ご不明な点は医師、看護師にお尋ねください 各種同意書類を提出してください 	<ul style="list-style-type: none"> 入れ歯、指輪、ピアス、時計などははずしてください ご家族の方は自室かデイルームにてお待ちください 	<ul style="list-style-type: none"> 腹痛や吐き気などありましたらすぐにお知らせください 	<ul style="list-style-type: none"> 退院となれば退院後の生活や次回の外来受診日についてお知らせします 治療継続となれば、医師より今後の治療について説明があります

※病名は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得ます

岐阜市民病院 消化器内科 令和4年3月改訂

※入院期間や治療内容は現時点で予想されるもので症状により変わります