


# ベバシズマブの治療を受けられる方へ

●ベバシズマブは結腸・直腸がんに用いられます。他の抗がん剤と併用して使用します。

## 投与スケジュール



併用療法例			
2週間コース	FOLFOX療法	FOLFIRI療法	FOLFOXIRI療法
3週間コース	XELOX療法	SOX療法	

## 主な副作用と発現時期

次のような症状が現れたら、医療スタッフにお知らせください。  
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

### ◇高血圧:頭痛、けいれん、ふらつき

定期的に血圧を測定し、**最大血圧が180mmHgまたは最小血圧120mmHgを超える場合は報告して下さい。**

### ◇蛋白尿

尿の蛋白質量が増加する場合があります。

### ◇粘膜出血:鼻出血、歯肉出血

10~15分たっても出血が止まらない場合、すぐに連絡してください。

### ◇血痰

喀血の前兆の可能性があるので、血痰の量が多くなる、または続く場合はすぐに連絡してください。

### ◇喀血/肺出血

大量の血液を吐いた(咳とともに、鮮紅色で泡状の血液が出る)場合、すぐに連絡してください。

### ◇白血球・好中球減少:抵抗力の低下

38℃以上の発熱がみられた場合、すぐに受診してください。

外出時はマスクを着用し、人ごみを避けてください。  
手洗い、うがいをこまめにしましょう。

### ◇脳梗塞

麻痺、ろれつが回らない、激しいめまいなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

### ◇心筋梗塞、狭心症

胸を刺すような、締めつけられるような痛みなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

### ◇深部静脈血栓症

足がむくみ、しびれなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。水分をとり、長時間同じ姿勢はとらないようにしましょう。

### ◇肺塞栓症

息切れ、息苦しさ、胸の痛みなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

### ◇消化管穿孔:腹痛

突然強い腹痛が起きた場合、痛み止めを使用せず、すぐに連絡してください。