2015.1作成

ジェムザール® + ナベルビン®療法を受けられる方へ

投与スケジュール



3週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※　個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日～数日	●吐き気・嘔吐　●食欲不振　●血管痛・静脈炎
治療数日～数週間	●白血球減少　●発疹　●疲労感 ●吐き気・嘔吐　●便秘　●肝機能低下

◇白血球減少：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。
外出時はマスクを着用し、人混みを避けましょう。
手洗い、うがいをこまめにしましょう。
怪我をしないように注意しましょう。もし怪我をした時は十分に手当てをしましょう。

◇便秘

高脂肪食品を控え、水分や食物繊維をとるようにしましょう。また、軽い散歩を心がけたり、おなかのマッサージをしたりしましょう。便秘が長く続き、おなかが張って苦しいときは、受診してください。

◇吐き気、嘔吐、食欲不振

消化の良いものや食べたいものを少量ずつ食べたりするようにしましょう。また、スポーツ飲料などで、十分な水分摂取を心がけましょう。

◇間質性肺炎

空咳（痰が出ない咳）、息切れ、発熱がみられた場合は、すぐに受診してください。

◇疲労感

「疲れる」「だるい」「身体が重い」といった症状が現れることがあります。無理せず体を十分に休め、体を冷やさないようにして、体力を保つようにしましょう。

◇発疹

細かく赤いかゆみのある斑点ができたり水ぶくれができたりします。

◇血管痛・静脈炎：疼痛、発赤、腫れ

点滴中および投与後に、注射部位が痛んだり、腫れてきた場合はすぐに医療スタッフにお知らせください。

◇肝機能低下

AST、ALTといった検査値が上昇することがあります。

文責：岐阜市民病院薬剤部　TEL: 058-251-1101