


エトポシド + カルボプラチン療法を受けられる方へ

投与スケジュール



3週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日～数日	●吐き気・嘔吐	●食欲不振	●静脈炎・血管痛
治療数日～数週間	●口内炎	●下痢	●白血球減少
	●血小板数減少		
数週間～数か月	●脱毛	●貧血	

◇白血球減少：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。

外出時はマスクを着用し、人混みを避けましょう。

手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇血小板減少：血が出やすい、アザができる

血が止まりにくくなるため、ケガや転倒、打撲には十分注意しましょう。また鼻かみや歯磨きは優しく行うようにしましょう。

◇貧血：めまい、息切れ、疲労

激しい運動は控え、疲れを感じたら無理をせず休むようにしましょう。

◇下痢

1日4回以上の排便や水様便がみられた場合は、すぐに受診してください。

下痢がある場合は乳酸菌食品の摂取を控えてください。

水分をこまめに摂り、温かくして安静に過ごしましょう。

◇吐き気、嘔吐、食欲不振

なるべく水分を摂るようにし、消化の良いものや食べたいものを少量ずつ食べるようにしましょう。

◇口内炎：口の中が痛い、しみる、味がおかしい

うがいなどをして口の中を清潔に保つようにしてください。

◇脱毛

髪の毛が2～4週後より抜けやすくなります。治療終了後2～6か月後より新しい毛が生え始めます。

◇肝機能障害

ASTやALTが上昇することがあります。疲れを感じる、尿の色が濃くなる、皮膚や白目が黄色くなるなどの症状が現れた場合は、すぐに連絡してください。