カドサイラ®による治療を受けられる方へ

投与スケジュール



3週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※　個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日	●インフュージョンリアクション
治療当日～数日	●吐き気・食欲不振　●鼻出血　●筋肉痛・関節痛
数日～数週間	●血小板減少　●白血球減少　●肝機能障害 ●倦怠感　●脱毛　●下痢　●便秘
数週間～数ヵ月	●心障害　●しびれ　●爪の変化　●涙目

◇インフュージョン・リアクション

初回投与時の点滴中～点滴開始後24時間以内に多く発現します。
発熱、悪寒、吐き気、頭痛、呼吸困難、発疹、体のかゆみなどの症状が現れたら医療スタッフにお知らせください。

◇間質性肺炎

息切れ、空咳、発熱などが現れたらすぐに受診してください。

◇吐き気、食欲不振

なるべく水分を摂るようにし、消化の良いものや　食べたいものを少量ずつ食べるようにしましょう。

◇筋肉痛・関節痛

投与数日後に、肩や背中などの筋肉や関節に痛みが現れることがあります。症状はほとんどが一時的なもので、数日後には回復します。

◇しびれ

手や足の指がしびれたり、感覚が鈍くなったりすることがあります。症状が気になるようになってきた場合はお知らせください。

◇白血球減少：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。
外出時はマスクを着用し、人混みを避けましょう。
手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇血小板減少：血が出やすい、アザができる

血が止まりにくくなるため、ケガや転倒、打撲には十分注意しましょう。また鼻かみや歯磨きは優しく行うようにしましょう。鼻血などの出血が止まらない、血の混ざった便や痰が出た場合はすぐに連絡してください。

◇肝機能障害

ASTやALTが上昇することがあります。疲れを感じる、尿の色が濃くなる、皮膚や白目が黄色くなるなどの症状が現れた場合は、すぐに連絡してください。

◇心障害

心臓の筋肉の働きを弱めることがあります。
呼吸困難、足のむくみ、咳の増加、頻脈、胸の痛み、息切れなどの症状が現れたら、すぐに連絡してください。

文責：岐阜市民病院薬剤部　TEL: 058-251-1101