


アブラキサン® + カルボプラチン療法を受けられる方へ

投与スケジュール



3~4週間を1コースとして繰り返します。

※ アブラキサン®で使用しているアルブミンはヒトの血液を原料としているため、製造する過程でウイルス等の感染防止対策を行っています。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日～数日

- 血管痛・静脈炎
- 関節痛・筋肉痛
- 過敏反応
- 手足のしびれ
- 吐き気・嘔吐

治療数日～数週間

- 口内炎
- 下痢
- 白血球減少
- 血小板減少

数週間～数か月

- 手足のしびれ
- 貧血
- 脱毛

◇血管痛・静脈炎

点滴中および投与後に、点滴部位が痛んだり腫れてきた場合はすぐにお申し出ください。

◇吐き気・食欲不振

水分を摂り、消化の良いものや食べたいものを少量ずつ食べましょう。

◇関節痛・筋肉痛

痛みのある部分を温めたり、体の中心へ向かってマッサージをしましょう。

◇末梢神経障害：手足のしびれなど

「しびれて歩きにくい」「細かな作業がしづらい」「感覚が鈍くなる」「手足の刺すような痛み」などの症状が現れることがあります。治療を続けるうちに悪化することがあるため、早めに報告してください。

◇脱毛

投与開始から数週間後に、髪の毛や体毛がほぼ抜け落ちます。治療が終了すると、また生え始めます。シャンプーは刺激の少ないものを使用しましょう。

◇好中球減少：発熱、寒気、のどの痛み、咳、頭痛

好中球が減少すると、抵抗力が低下して、感染症にかかりやすくなります。

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。

外出時はマスクを着用し、人ごみを避けましょう。手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇貧血：めまい、息切れ、疲労

ヘモグロビンが減少すると、貧血症状(めまいなど)が現れることがあります。

激しい運動は控え、疲れを感じたら、あまり無理をせず、こまめに休むようにしましょう。

◇血小板減少：血が止まりにくい、アザができる

血小板は血液を固める働きがあるため、減少すると血が止まりにくくなります。

ケガや転倒、打撲には十分注意し、歯磨きや鼻をかむときは優しく行いましょう。