2021.11作成

ベバシズマブの治療を受けられる方へ

●ベバシズマブは扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌に用いられます。他の抗がん剤と併用したり、単独で継続使用したりします。

投与スケジュール



3週間を1コースとして繰り返します。

併用療法例	
CBDCA+PTX療法	CDDP+PEM療法
GEM+CDDP療法	CBDCA+PEM療法　など

主な副作用

次のような症状が現れたら、医療スタッフにお知らせください。
※　個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

◇高血圧：頭痛、けいれん、ふらつき
定期的に血圧を測定し、最大血圧が180mmHgまたは最小血圧120mmHgを超える場合は報告して下さい。

◇蛋白尿
尿の蛋白質量が増加する場合があります。

◇粘膜出血：鼻出血、歯肉出血
10～15分たっても出血が止まらない場合、すぐに連絡してください。

◇血痰
喀血の前兆の可能性があるので、血痰の量が多くなる、または続く場合はすぐに連絡してください。

◇白血球・好中球減少：抵抗力の低下
38℃以上の発熱がみられた場合、すぐに受診してください。
外出時はマスクを着用し、人ごみを避けてください。
手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇喀血/肺出血
大量の血液を吐いた（咳とともに、鮮紅色で泡状の血液が出る）場合、すぐに連絡してください。

◇脳梗塞
麻痺、ろれつが回らない、激しいめまいなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

◇心筋梗塞、狭心症
胸を刺すような、締めつけられるような痛みなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

◇深部静脈血栓症
足がむくみ、しびれなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。水分をとり、長時間同じ姿勢はとらないようにしましょう。

◇肺塞栓症
息切れ、息苦しさ、胸の痛みなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

◇消化管穿孔：腹痛
突然強い腹痛が起きた場合、痛み止めを使用せず、すぐに連絡してください。

文責：岐阜市民病院薬剤部　TEL: 058-251-1101