

S-1 + ドセタキセルによる治療を受けられる方へ

投与スケジュール

エスワン内服 (14日間)		休薬期間 (7日間)
1日目	2日目以降	
ドセタキセル	エスワン内服	
 点滴	 内服 40～60mg/回 (朝・夕食後 1日2回)	
1コース(3週間)		

3週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日	●過敏反応 ●血管痛・静脈炎
治療当日～数日	●吐き気・嘔吐 ●食欲不振
数日～数週間	●骨髄抑制※ ●筋肉・関節の痛み ●疲労感(倦怠感) ●味覚の変化 ●脱毛 ●下痢 ●口内炎 ●発疹・皮膚炎
数週間～数カ月	●浮腫(むくみ) ●しびれ ●爪の変化 ●涙目

※ 骨髄抑制 : 白血球減少、貧血、血小板減少

◇ 過敏反応

息苦しい、胸が苦しい、体がかゆい、顔がほてる、汗が出る場合はすぐに申し出てください。

◇ 血管痛・静脈炎

点滴中および投与後に、注射部位が腫れたり、痛みや灼熱感を感じた場合は、すぐにスタッフにお知らせください。

◇ 吐き気、嘔吐、食欲不振

なるべく水分を摂るようにし、消化の良いものや食べたいものを少量ずつ食べるようにしましょう。

◇ 筋肉痛・関節痛

投与数日後に、肩や背中などの筋肉や関節に痛みが現れることがあります。症状はほとんどが一時的なもので、数日後には回復します。

◇ 白血球減少：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。

外出時はマスクを着用し、人混みを避けましょう。手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇ 脱毛

治療を始めて2～3週間後から徐々に頭髪が抜け始めることがあります。

◇ 浮腫(むくみ)

塩分や水分のとりすぎに気をつけましょう。定期的に体重を測定しましょう。

◇ しびれ

手や足の指がしびれたり、感覚が鈍くなったりすることがあります。物がつかみにくくなったり、歩きづらくなったりした場合は早めに報告して下さい。

◇ 流涙

涙が出る、目の充血・痛み・かすみなどの症状がある場合は主治医または眼科医に相談して下さい。

◇ 爪の変化

爪の変色、爪の周囲の腫れ、痛み、熱感などの症状が現れ、ひどい場合には爪がはがれることがあります。爪がはがれた場合には感染症を起こしやすいので、清潔に保ち、絆創膏などで保護しましょう。