2023.3作成

# キイトルーダ®による治療を受けられる方へ

●キイトルーダ®は子宮頸癌に対して、他の抗がん剤と併用して使用します。

## 投与スケジュール

3週間を1コースとして繰り返します。

## 主な副作用と発現時期

**次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。**
※　個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

| | | |
|---|---|---|
| 点滴中～投与後24時間 | ●インフュージョンリアクション | |
| 治療期間中<br>（比較的早期に発現） | ●皮膚障害<br>●大腸炎 | ●甲状腺機能障害<br>●肝機能障害 |
| 治療期間中 | ●間質性肺炎<br>●神経障害 | ●1型糖尿病<br>●重症筋無力症 |

### ◇インフュージョンリアクション
点滴中や投与後24時間以内に、発熱、悪寒、発疹、かゆみ、呼吸困難などの症状が起こる場合があります。
動悸がする、発疹が出てかゆい、熱っぽさを感じるなどがあった場合はすぐにお知らせください。

### ◇間質性肺炎
息切れ、空咳、発熱などが現れたらすぐに受診してください。

### ◇重症筋無力症
手足に力が入らない、繰り返し運動で疲れる、ものが二重に見える、まぶたが重くなるなどの症状が出たら、受診してください。

### ◇大腸炎
大腸の粘膜が傷んで、下痢などが起こりやすくなります。
持続する腹痛やひどい下痢が続いたり、血の混じった便が出たりする場合は受診してください。また、自己判断による下痢止めの使用は避けてください。

### ◇副腎機能障害
意識が薄れる、吐き気がする、体がだるい、食欲がない、むかむかするなどの症状が現れたら、受診してください。

### ◇肝機能障害
皮膚や白目が黄色い、体がだるいなどの症状が現れたら、受診してください。

### ◇甲状腺機能障害
いつもより疲れやすい、体重が急に増える・減る、いらいらしたり物忘れしたりしやすくなるなどの症状が現れたら、医療スタッフに連絡してください。

### ◇1型糖尿病
いつもよりのどが渇く、体重が減る、水分を多くとるようになるなどの症状が現れたら、受診してください。

### ◇筋炎・横紋筋融解症
筋肉に炎症が起こることがあります。からだに力が入らない、飲み込みにくい、息苦しい、筋肉の痛み、赤褐色尿などの症状が現れたら、受診してください。

### ◇皮膚障害
発疹、かゆみ、白斑が現れることがあります。まれに皮膚や粘膜など、全身に広がるような重度の皮膚症状が起こることがありますので、このような症状があったら、医療スタッフに連絡してください。

### ◇神経障害
足がしびれて歩きにくい、細かな作業がしづらい、感覚が鈍くなる、手足が刺すように痛いなどの症状が現れることがありますので、このような症状があったら、医療スタッフに連絡してください。

文責：岐阜市民病院薬剤部　TEL: 058-251-1101