ジェブタナ®による治療を受けられる方へ

投与スケジュール

1日目	2日目以降
ジェブタナ®	休薬期間
点滴	プレドニゾロン 内服

1コース（3週間）

3週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※　個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日	●過敏反応　●血管痛・静脈炎
治療当日～数日	●吐き気・嘔吐　●食欲不振
治療数日～数週間	●骨髄抑制※　●筋肉痛・関節痛　●疲労感（倦怠感） ●味覚の変化　●脱毛　●下痢　●口内炎　●発疹・皮膚炎
治療数週間～数ヵ月	●浮腫（むくみ）　●しびれ

※　骨髄抑制　：　白血球減少、貧血、血小板減少

◇過敏反応

息苦しい、胸が苦しい、体がかゆい、顔がほてる、汗が出る場合はすぐに申し出てください。多くの場合、数分以内で起こります。
過敏反応を抑える薬を事前に投与します。

◇血管痛・静脈炎

点滴中および投与後に、注射部位が腫れたり、痛みや灼熱感を感じた場合は、すぐにスタッフにお知らせください。

◇吐き気、嘔吐、食欲不振

なるべく水分を摂るようにし、消化の良いものや　食べたいものを少量ずつ食べるようにしましょう。

◇下痢

1日に何度も下痢が続く場合は、受診してください。
スポーツ飲料などで水分をこまめに補給し、温かくして安静に過ごしましょう。

◇疲労感

「疲れる」「だるい」「身体が重い」といった症状が現れることがあります。無理せず体を十分に休め、体を冷やさないようにして、体力を保つようにしましょう

◇白血球減少：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。
外出時はマスクを着用し、人混みを避けましょう。
手洗い、うがいをこまめにしましょう。
感染症予防のため、お薬を予防的に投与することもあります。

◇貧血

赤血球が減少すると、めまいや立ちくらみを起こすことがあります。急激な動作は控え、疲れを感じたら、あまり無理をせず、こまめに休むようにしましょう。

◇しびれ

手や足の指がしびれたり、感覚が鈍くなったりすることがあります。転ばないように注意し、熱いものや刃物などの危険なものを取り扱うときにはけがをしないように十分注意しましょう。

文責：岐阜市民病院薬剤部　TEL: 058-251-1101